

The effects of squint surgery on double vision and abnormal head posture in patients with Graves eye disease.

Gepubliceerd: 18-01-2013 Laatste bijgewerkt: 18-08-2022

There is a significant correlation between the changes in the field of binocular single vision and the quality of life measured with the GO-QoL and the TED-QoL.

Ethische beoordeling	Positief advies
Status	Werving gestart
Type aandoening	-
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON22894

Bron

NTR

Verkorte titel

GINTS study

Aandoening

Graves'orbitopathy
strabismus surgery
Quality of life

Ondersteuning

Primaire sponsor: none

Overige ondersteuning: none

Onderzoeksproduct en/of interventie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Primary outcome measure will be the correlation between the changes in the field of BSV and QoL.

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

To evaluate the outcome of strabismus surgery in Graves' Orbitopathy patients on binocular function and quality of life.

Doel van het onderzoek

There is a significant correlation between the changes in the field of binocular single vision and the quality of life measured with the GO-QoL and the TED-QoL.

Onderzoeksopzet

3 months postoperatively.

Onderzoeksproduct en/of interventie

Strabismus surgery.

Contactpersonen

Publiek

Meibergdreef 9
H.M. Jellema
Amsterdam 1105 AZ
The Netherlands

Wetenschappelijk

Meibergdreef 9
H.M. Jellema
Amsterdam 1105 AZ
The Netherlands

Deelname eisen

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

1. GO-patients, who are clinically and biochemically euthyroid for at least three months;
2. GO-patients, who show a stable orthoptic picture for at least three months: Stable means no greater than 5 prism dioptres change in primary position and no greater change in duction as 8°.

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

1. GO-patients with suppression (inhibition of the image of the deviating eye in the visual cortex);
2. Presence of previously diagnosed and/or treated for squint not related to the thyroid;
3. Presence of vision less than 0,2 for one or both eyes.

Onderzoeksopzet

Opzet

Type:	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen
Onderzoeksmodel:	Parallel
Toewijzing:	N.v.t. / één studie arm
Blinding:	Open / niet geblindeerd
Controle:	N.v.t. / onbekend

Deelname

Nederland	
Status:	Werving gestart
(Verwachte) startdatum:	31-01-2013
Aantal proefpersonen:	40

Type:

Verwachte startdatum

Ethische beoordeling

Positief advies

Datum:

18-01-2013

Soort:

Eerste indiening

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
NTR-new	NL3644
NTR-old	NTR3796
Ander register	AMC : 1001
ISRCTN	ISRCTN wordt niet meer aangevraagd.

Resultaten

Samenvatting resultaten

N/A