

The effectiveness of supportgroups for people suffering from psychosis: a randomized controlled trial.

Gepubliceerd: 03-08-2006 Laatste bijgewerkt: 18-08-2022

Participation in supportgroups leads to an improvement in quality of life, social support, social network, self-efficacy and self-esteem.

Ethische beoordeling	Positief advies
Status	Werving gestopt
Type aandoening	-
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

ID

NL-OMON24883

Bron

NTR

Verkorte titel

N/A

Aandoening

Psychosis

Schizophrenia

Ondersteuning

Primaire sponsor: This study was granted by Zon Mw, The Netherlands Organisation for Health Research and Development.

Onderzoeksproduct en/of interventie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

N/A

Doel van het onderzoek

Participation in supportgroups leads to an improvement in quality of life, social support, social network, self-efficacy and self-esteem.

Onderzoeksopzet

N/A

Onderzoeksproduct en/of interventie

The peer support group involved 16 sessions of 1 ½ hours. The waiting-list control group received treatment as usual (TAU). The trial took place over 8 months. The groups – with approximately 10 patients - were minimal guided by a nurse. Nurses were trained in the methodology which was especially developed for people with schizophrenia. The nurse was present at the start from the start and did offer structure, but did not interfere with the group process.

Contactpersonen

Publiek

University Medical Center Groningen (UMCG), department of psychiatry
RGOc, room 5.29
P.O Box 30.001
S. Castelein
Groningen 9700 RB
The Netherlands
+31(0)50 3611956

Wetenschappelijk

University Medical Center Groningen (UMCG), department of psychiatry

RGOc, room 5.29
P.O Box 30.001
S. Castelein
Groningen 9700 RB
The Netherlands
+31(0)50 3611956

Deelname eisen

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

1. Suffered from one or more psychotic episodes;
2. Outpatient;
3. 18 years or older.

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

1. Drug- or alcohol misuse;
2. Suffering from psychotic symptoms that influence the group process.

Onderzoeksopzet

Opzet

Type:	Interventie onderzoek
Onderzoeksmodel:	Parallel
Toewijzing:	Gerandomiseerd
Blinding:	Open / niet geblindeerd
Controle:	Geneesmiddel

Deelname

Nederland
Status: Werving gestopt
(Verwachte) startdatum: 01-02-2003
Aantal proefpersonen: 106
Type: Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Positief advies
Datum: 03-08-2006
Soort: Eerste indiening

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
NTR-new	NL737
NTR-old	NTR747
Ander register	: N/A
ISRCTN	ISRCTN02457313

Resultaten

Samenvatting resultaten

S. Castelein, R. Bruggeman, J.T. van Busschbach, M. van der Gaag, P.J. Mulder, H. Kneegtering en D. Wiersma. The effectiveness of support groups for people suffering from psychosis: a multi-center randomized controlled trial. *Schizophrenia Bulletin*. 2005, vol. 31, number 2, 521