

Observational study; Lacunar stroke and secondary worsening.

Gepubliceerd: 11-10-2007 Laatste bijgewerkt: 18-08-2022

Lacunar strokes tend to show secondary worsening of symptoms, more often than cortical strokes. This is probably due to (extreme) blood pressure falls during the night in hypertensive patients, causing hypoperfusion of the brain.

Ethische beoordeling	Positief advies
Status	Werving gestart
Type aandoening	-
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON26152

Bron

Nationaal Trial Register

Verkorte titel

N/A

Aandoening

Cortical strokes versus lacunar strokes.

Ondersteuning

Primaire sponsor: Department of Neurology, Atrium Medical centre, Heerlen.
Supervisor: Dr. C. Franke, Neurologist, Atrium MC, Heerlen.

Onderzoeksproduct en/of interventie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Worsening of more than 2 points on the NIHSS scores during the stay on the brain care unit.

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Trial to compare secondary worsening (by scoring the NIHSS), during the stay on the brain care unit, in patients with lacunar stroke versus patients with cortical stroke.

Doel van het onderzoek

Lacunar strokes tend to show secondary worsening of symptoms, more often than cortical strokes.

This is probably due to (extreme) blood pressure falls during the night in hypertensive patient's, causing hypoperfusion of the brain.

Onderzoeksopzet

NIHSS score after entering the hospital, leaving the braincare unit and if there is a secondary worsening of symptoms during the stay on the brain care unit.

Onderzoeksproduct en/of interventie

N/A

Contactpersonen

Publiek

Koperslagersdreef 25b

J.R.F. Schweitzer,
Maastricht 6216 SN
The Netherlands

Wetenschappelijk

Koperslagersdreef 25b

J.R.F. Schweitzer,
Maastricht 6216 SN
The Netherlands

Deelname eisen

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

All ischemic strokes wich enter the "brain care unit".

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Ischemic strokes in a certain condition wich is to good for the "brain care unit" (for instance patient's with a TIA or patients with almost no symptoms left while entering the Hospital).

Onderzoeksopzet

Opzet

Type:	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen
Onderzoeksmodel:	Parallel
Toewijzing:	N.v.t. / één studie arm
Blinding:	Open / niet geblindeerd
Controle:	Actieve controle groep

Deelname

Nederland	
Status:	Werving gestart
(Verwachte) startdatum:	01-10-2007
Aantal proefpersonen:	200
Type:	Verwachte startdatum

Ethische beoordeling

Positief advies

Datum: 11-10-2007
Soort: Eerste indiening

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
NTR-new	NL1059
NTR-old	NTR1092
Ander register	Neurology : wordt doorgegeven
ISRCTN	wordt niet aangevraagd/Observational study

Resultaten

Samenvatting resultaten

N/A