

Cancer risk in type 2 diabetes patients treated with sulfonylurea.

Gepubliceerd: 06-01-2017 Laatste bijgewerkt: 18-08-2022

Patients with Type 2 diabetes have been shown to have an increased risk for developing cancer, especially obesity related cancers. There is some evidence that within the class of sulfonylureas there is a difference in cancer risk; gliclazide could...

Ethische beoordeling	Positief advies
Status	Werving gestart
Type aandoening	-
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON26303

Bron

NTR

Verkorte titel

ZODIAC-55

Aandoening

Type 2 diabetes, cancer, kanker.

Ondersteuning

Primaire sponsor: Diabetes Centre Isala

Overige ondersteuning: ZonMW

Onderzoeksproduct en/of interventie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Within-sulfonylurea-class differences in obesity-related cancer risk (hazard ratio).

Toelichting onderzoek

Doel van het onderzoek

Patients with Type 2 diabetes have been shown to have an increased risk for developing cancer, especially obesity related cancers. There is some evidence that within the class of sulfonylureas there is a difference in cancer risk; gliclazide could be associated with a decreased cancer risk when compared to the other sulfonylureas.

Onderzoeksopzet

Hazard ratio will be calculated for a period up to 10 years.

Onderzoeksproduct en/of interventie

Individual sulfonylurea treatment (gliclazide, glimepiride, tolbutamide, glibenclamide)

Contactpersonen

Publiek

Dr. Spanjaardweg 11, 2e etage

Dennis Schrijnders
Zwolle 8025 BT
The Netherlands
0031-38-4247763

Wetenschappelijk

Dr. Spanjaardweg 11, 2e etage

Dennis Schrijnders
Zwolle 8025 BT
The Netherlands
0031-38-4247763

Deelname eisen

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

Type 2 diabetes patients treated with sulfonylureas

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Type 2 diabetes patients treated with long-acting or mixed insulin before oral glucose lowering agents and those receiving insulin on top of sulfonylurea at study entry.

Onderzoeksopzet

Opzet

Type:	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen
Onderzoeksmodel:	Parallel
Toewijzing:	Gerandomiseerd
Blinding:	Enkelblind
Controle:	Geneesmiddel

Deelname

Nederland	
Status:	Werving gestart
(Verwachte) startdatum:	30-01-2017
Aantal proefpersonen:	0
Type:	Verwachte startdatum

Ethische beoordeling

Positief advies	
Datum:	06-01-2017
Soort:	Eerste indiening

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
NTR-new	NL6035
NTR-old	NTR6166
Ander register	: ZODIAC-55, METC 13.0765

Resultaten