

Cost-effectiveness of cognitive behaviour therapy for recent onset schizophrenia patients with persistent and recurrent psychosis.

Gepubliceerd: 06-09-2005 Laatste bijgewerkt: 18-08-2022

To determine the cost-effectiveness of CBT compared to care as usual in patients with a recent onset of schizophrenia, who suffer from persistent and recurrent symptoms of psychosis.

Ethische beoordeling	Positief advies
Status	Werving gestopt
Type aandoening	-
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

ID

NL-OMON26514

Bron

NTR

Verkorte titel

COCOS

Aandoening

Schizophrenia

Ondersteuning

Primaire sponsor: no sponsoring by industry

Overige ondersteuning: Zorg onderzoek Nederland MW

Onderzoeksproduct en/of interventie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Days functioning in normal range based on PSYRAYS and SFS: minimal suffering and functional restrictions by delusions and/or hallucinations and SFS normal social functioning.

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

This study determines the cost-effectiveness of CBT in schizophrenia patients with persistent and recurrent psychosis. The intervention is done in regular schizophrenia treatment at nine sites in the Netherlands.

Doel van het onderzoek

To determine the cost-effectiveness of CBT compared to care as usual in patients with a recent onset of schizophrenia, who suffer from persistent and recurrent symptoms of psychosis.

Onderzoeksopzet

N/A

Onderzoeksproduct en/of interventie

1. CBT by a cognitive therapist and a nurse therapist;
2. CAU.

Contactpersonen

Publiek

Parnassia & Groningen University,
Oude Haagweg 353,

M. Gaag, van der
Oude Haagweg 353,

Den Haag 2552 ES
The Netherlands
+31 (0)70 3917622

Wetenschappelijk

Parnassia & Groningen University,
Oude Haagweg 353,

M. Gaag, van der
Oude Haagweg 353,

Den Haag 2552 ES
The Netherlands
+31 (0)70 3917622

Deelname eisen

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

1. Schizophrenia patients in te first five years after onset;
2. Age 18-64;
3. Treatment resistant or recurrent psychosis.

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

1. IQ<80;
2. Severe addiction;
3. No competence of Dutch language;
4. 4 or more CBT sessions in the last year.

Onderzoeksopzet

Opzet

Type:	Interventie onderzoek
Onderzoeksmodel:	Parallel
Toewijzing:	Gerandomiseerd
Blindering:	Enkelblind
Controle:	Placebo

Deelname

Nederland	
Status:	Werving gestopt
(Verwachte) startdatum:	01-12-2004
Aantal proefpersonen:	230
Type:	Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Positief advies	
Datum:	06-09-2005
Soort:	Eerste indiening

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register

NTR-new

NTR-old

Ander register

ISRCTN

ID

NL189

NTR226

ZonMW : 945-04-406

ISRCTN57292778

Resultaten

Samenvatting resultaten

N/A