

Studie naar hysteroscopische behandeling van littekendefecten na sectio bij patienten met abnormaal uterien bloedverlies.

Gepubliceerd: 23-07-2009 Laatste bijgewerkt: 15-05-2024

Is resection of cesarean scar tissue in patients with a cesarean scar defect and abnormal bleeding a safe and effective treatment.

Ethische beoordeling	Niet van toepassing
Status	Werving gestart
Type aandoening	-
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

ID

NL-OMON26833

Bron

NTR

Verkorte titel

HysPAS

Aandoening

abnormal uterine bleeding
cesarean scar defect
hysteroscopic resection
abnormaal uterien bloedverlies
littekendefect na sectio
hysteroscopie

Ondersteuning

Primaire sponsor: S. Veersema, gynaecoloog St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
L.F. van der Voet, gynaecoloog Deventer Ziekenhuis, Deventer
Prof H.A.M. Brollman, gynaecoloog VU Medisch Centrum Amsterdam
Overige ondersteuning: stichting nieuwegyn

Onderzoeksproduct en/of interventie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Decrease in days of bloodloss/spotting (pictorial chart).

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

There is a association between uterine bleeding disorders and a cesarean scar defect. Patients with abnormal uterine bleeding and a cesarean scar defect in the uterus (seen by contrast sonohysterography) will undergo a hysteroscopic resection of the scarred tissue. Primary outcome is decrease of days of abnormal bleeding. Secondary outcome are patients satisfaction, quality of live and decrease of dysmenorrhoe. Also the safety of the procedure will be investigated. Patients fullfill a questionnaire and a pictorial chart of their menstruation before operation and 3 and 12 months post operative. And will have a contrast sonohysterography before operation and 3 moths post operative.

Doel van het onderzoek

Is resection of cesarean scar tissue in patients with a cesarean scar defect and abnormal bleeding a safe and effective treatment.

Onderzoeksopzet

Questionnaire at inclusion, 3 en 12 months post operative.

Onderzoeksproduct en/of interventie

Hysteroscopic resection of cesarean scar tissue in uterus/cervix.

Contactpersonen

Publiek

Deventer ziekenhuis/St Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
N. Bolkesteinlaan 75
L.F. Voet, van der
Deventer ziekenhuis/St Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
N. Bolkesteinlaan 75
Deventer 7416 SE
The Netherlands
+31 (0)570 - 53 50 52

Wetenschappelijk

Deventer ziekenhuis/St Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
N. Bolkesteinlaan 75
L.F. Voet, van der
Deventer ziekenhuis/St Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
N. Bolkesteinlaan 75
Deventer 7416 SE
The Netherlands
+31 (0)570 - 53 50 52

Deelname eisen

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

Patients with a cesarean scar defect and abnormal uterine bleeding.

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

1. Pregnancy;
2. Wish for pregnancy in future;
3. Other gynaecological problems (myoma, polyps).

Onderzoeksopzet

Opzet

Type: Interventie onderzoek
Onderzoeksmodel: Parallel
Toewijzing: N.v.t. / één studie arm
Controle: N.v.t. / onbekend

Deelname

Nederland
Status: Werving gestart
(Verwachte) startdatum: 09-01-2009
Aantal proefpersonen: 22
Type: Verwachte startdatum

Ethische beoordeling

Niet van toepassing
Soort: Niet van toepassing

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

ID: 32934
Bron: ToetsingOnline
Titel:

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register

NTR-new

NTR-old

CCMO

ISRCTN

OMON

ID

NL1812

NTR1922

NL28897.100.09

ISRCTN wordt niet meer aangevraagd.

NL-OMON32934

Resultaten

Samenvatting resultaten

N/A