

Reduction of low back pain using Krullaards Perfect Reset plate therapy

Gepubliceerd: 27-11-2015 Laatste bijgewerkt: 18-08-2022

It is hypothesized that an intervention with the KPR could decrease pelvic tilt, as measured using clinical leg length difference and the ASIS-PSIS angle, for 50% or create a crest height difference smaller than 0.5 centimeters in patients with non...

Ethische beoordeling	Niet van toepassing
Status	Werving nog niet gestart
Type aandoening	-
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

ID

NL-OMON26954

Bron

NTR

Aandoening

non specific low back pain

Ondersteuning

Primaire sponsor: Stichting RevaZorg

Arnhemseweg 2
7331 BK Arnhem
info@revazorg.nl

Overige ondersteuning: Stichting RevaZorg

Arnhemseweg 2
7331 BK Arnhem
info@revazorg.nl

Onderzoeksproduct en/of interventie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

1 - Reduction of low back pain using Krullaards Perfect Reset plate therapy 6-05-2025

Effect of the KPR on iliac crest height difference in centimetres in patients with chronic low back pain.

Toelichting onderzoek

Doel van het onderzoek

It is hypothesized that an intervention with the KPR could decrease pelvic tilt, as measured using clinical leg length difference and the ASIS-PSIS angle, for 50% or create a crest height difference smaller than 0.5 centimeters in patients with non specific low back pain.

Onderzoeksopzet

All test will be performed on the same day

Onderzoeksproduct en/of interventie

One treatment with Krullaards Perfect Reset therapy plate

Contactpersonen

Publiek

Normandie 10

Kayleigh J. Polman
Utrecht 3524 RK
The Netherlands

Wetenschappelijk

Normandie 10

Kayleigh J. Polman
Utrecht 3524 RK
The Netherlands

Deelname eisen

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

18 - 60 years

an episode non specific low back pain of three months or longer

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

- Demonstrable cause of low back pain
- Other physical therapy or drug interventions during study period and previous month
- Not able to speak and read Dutch
- Difference in crest height of less than 0.5 centimeters at the first measurement
- Anatomical LLD of 0.5 centimeters or more
- ASIS, PSIS and trochanter major not palpable due to heavy obesity.
- Pregnancy
- Acute trombosis

Onderzoeksopzet

Opzet

Type:	Interventie onderzoek
Onderzoeksmodel:	Parallel
Blindering:	Dubbelblind
Controle:	Placebo

Deelname

Nederland	
Status:	Werving nog niet gestart

(Verwachte) startdatum: 01-03-2015
Aantal proefpersonen: 50
Type: Verwachte startdatum

Ethische beoordeling

Niet van toepassing
Soort: Niet van toepassing

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
NTR-new	NL5387
NTR-old	NTR5488
Ander register	: volgt

Resultaten