

Atrial fibrillation and presentation of stroke.

Gepubliceerd: 18-08-2009 Laatste bijgewerkt: 18-08-2022

The purpose of this prospective, observational one- centre study is to evaluate the relation between atrial fibrillation and clinical characteristics, including isolated aphasia, in a population of patients with ischemic stroke due to either atrial...

Ethische beoordeling	Niet van toepassing
Status	Werving nog niet gestart
Type aandoening	-
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON27643

Bron

NTR

Verkorte titel

N/A

Aandoening

ischemic stroke, atrial fibrillation, aphasia

herseneninfarct, atriumfibrilleren, afasie

Ondersteuning

Primaire sponsor: none

Overige ondersteuning: none

Onderzoeksproduct en/of interventie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Primary outcome is a clinical presentation at admittance with an isolated aphasia in patients with a cardio-embolic stroke versus a presentation of isolated aphasia in patients with an atherothrombotic stroke.

The presence type and severity of aphasia are investigated by the Screening Test and the Boston naming test, within 5 days of admittance.

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

The purpose of this prospective, observational one- centre study is to evaluate the relation between atrial fibrillation and clinical characteristics, including isolated aphasia, in a population of patients with ischemic stroke due to either atrial fibrillation or atherothrombotic origin in order to obtain additional predictive factors of the cardioembolic origin in stroke. We presume that a presentation of stroke with isolated aphasia signifies a cardioembolic stroke.

Doel van het onderzoek

The purpose of this prospective, observational one- centre study is to evaluate the relation between atrial fibrillation and clinical characteristics, including isolated aphasia, in a population of patients with ischemic stroke due to either atrial fibrillation or atherothrombotic origin in order to obtain additional predictive factors of the cardioembolic origin in stroke. We presume that a presentation of stroke with isolated aphasia signifies a cardioembolic stroke.

Onderzoeksopzet

Data will be collected during the normal hospital stay.

Onderzoeksproduct en/of interventie

None other than regular diagnostic work-up.

Contactpersonen

Publiek

Atrium MC Parkstad
PO Box 4446
T. Schreuder
Atrium MC Parkstad

PO Box 4446
Heerlen 6401 CX
The Netherlands
+31 (0)45-5766700

Wetenschappelijk

Atrium MC Parkstad
PO Box 4446
T. Schreuder
Atrium MC Parkstad
PO Box 4446
Heerlen 6401 CX
The Netherlands
+31 (0)45-5766700

Deelname eisen

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

All patients admitted with an acute ischemic stroke.

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Hemorrhagic stroke.

Onderzoeksopzet

Opzet

Type:	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen
Onderzoeksmodel:	Anders
Toewijzing:	N.v.t. / één studie arm
Blinding:	Open / niet geblindeerd
Controle:	N.v.t. / onbekend

Deelname

Nederland	
Status:	Werving nog niet gestart
(Verwachte) startdatum:	24-08-2009
Aantal proefpersonen:	800
Type:	Verwachte startdatum

Ethische beoordeling

Niet van toepassing	
Soort:	Niet van toepassing

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
NTR-new	NL1848
NTR-old	NTR1959
Ander register	METC Atrium MC : 09-N-69
ISRCTN	ISRCTN wordt niet meer aangevraagd.

Resultaten

Samenvatting resultaten

N/A