

Can a novel perfusion monitor help us defining optimal flow for patients on cardiopulmonary bypass.

Gepubliceerd: 23-04-2014 Laatste bijgewerkt: 18-08-2022

Evaluation of the golden standard in perfusion by using a perfusion monitor to evaluate adequate oxygen delivery.

Ethische beoordeling	Positief advies
Status	Werving gestart
Type aandoening	-
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON28731

Bron

NTR

Verkorte titel

N/A

Aandoening

Cardiopulmonary bypass, perfusion monitor, cardiovascular patients, adequate oxygen delivery, hypo-perfusion, hyper perfusion, postoperative complications, individual circulatory treatment.

Ondersteuning

Primaire sponsor: Universitair Ziekenhuis Brussel

Laarbeeklaan 101

1090 Jette

Overige ondersteuning: Universitair Ziekenhuis Brussel

Laarbeeklaan 101

1090 Jette

Onderzoeksproduct en/of interventie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Which oxygen flow gives hyperlactatemia?

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Adequate oxygen delivery (D_{O2}) to the organs and tissues of the cardiovascular patient is the primary principle of putting patients on cardiopulmonary bypass (CPB). The golden standard for calculation of flow is 2,4 L/min/m² body surface area (BSA). Blood flow during CPB is standardized worldwide; i.e. 2,2-2,5 LPM/m². There is an increasing tendency towards a more individual circulatory treatment. In fact, individualized goal-directed therapy has been shown to reduce postoperative complications and mortality in high-risk surgery.

Hypo-perfusion (defined as the inadequate delivery of oxygen) and the resulting Hyperlactatemia are well described and quantified, as well as their postoperative consequences. The effects of hyper-perfusion are far less investigated.

A new perfusion monitor is developed to continuously monitor, in real-time and online, the different determinants of oxygen delivery and oxygen consumption of the patient.

Doel van het onderzoek

Evaluation of the golden standard in perfusion by using a perfusion monitor to evaluate adequate oxygen delivery.

Onderzoeksopzet

- 1) Blood gas before cardiopulmonary bypass(CPB), after 10', 30', 60', 90', 120' and post CPB.
- 2) Postoperative we will also look at the highest lactate level during hospital stay.

Onderzoeksproduct en/of interventie

Arterial and venous connector for inline measurement. Regular blood gas analysis. Blood flow sensor measurement.

Contactpersonen

Publiek

Laarbeeklaan 101
Veerle Mossevelde, van
Brussels 1090
The Netherlands
+32 (0)2 4763134

Wetenschappelijk

Laarbeeklaan 101
Veerle Mossevelde, van
Brussels 1090
The Netherlands
+32 (0)2 4763134

Deelname eisen

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

- Patients scheduled for cardiac surgery.
- Normothermic cases and maximum duration less than 2 hours.

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

- Complicated cases
- CPB duration over 2 hours
- renal insufficiency
- emergency
- reanimation

-salvage and existing inflammatory conditions.

Onderzoeksopzet

Opzet

Type:	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen
Onderzoeksmodel:	Anders
Toewijzing:	N.v.t. / één studie arm
Blinding:	Enkelblind
Controle:	N.v.t. / onbekend

Deelname

Nederland	
Status:	Werving gestart
(Verwachte) startdatum:	17-02-2014
Aantal proefpersonen:	150
Type:	Verwachte startdatum

Ethische beoordeling

Positief advies	
Datum:	23-04-2014
Soort:	Eerste indiening

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
NTR-new	NL4399
NTR-old	NTR4596
Ander register	MEC UZ Brussel : 2014/017

Resultaten

Samenvatting resultaten

N/A