

Gebruik van probiotica om reizigersdiarree te voorkomen (NL)

Gepubliceerd: 01-10-2007 Laatste bijgewerkt: 18-08-2022

Use of a well defined probiotic food supplement (Ecologic Travel) will reduce incidence of traveller's diarrhoea.

Ethische beoordeling	Positief advies
Status	Werving gestopt
Type aandoening	-
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

ID

NL-OMON28760

Bron

Nationaal Trial Register

Verkorte titel

N/A

Aandoening

1. Diarrrhoea;
2. travellers;
3. probiotics;
4. reizigersdiarree;
5. probiotica.

Ondersteuning

Primaire sponsor: AMC, Travel Clinic, dept Tropical Medicine
Winclove Bio Industries bv

Overige ondersteuning: Dept tropical medicine
Winclove Bio Industries

Onderzoeksproduct en/of interventie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

50% reduction of incidence of traveller's diarrhoea.

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Traveller's diarrhoea occurs in 20 to 50 % of travellers to low or middle income countries. Several areas of the world are known for the high incidence of diarrhoea in visitors. Probiotics have been suggested as a save and effective method to prevent traveller's diarrhoea. So far studies are inconclusive, in part because various probiotics have been used, not always well defined. In this prospective, placebo controlled, double blinded study a well defined, multispecies probiotic product will be used.

Doel van het onderzoek

Use of a well defined probiotic food supplement (Ecologic Travel) will reduce incidence of traveller's diarrhoea.

Onderzoeksproduct en/of interventie

Use of probiotic food supplement.

Contactpersonen

Publiek

Travel Clinic AMC, dept Tropical Medicine,
K R Gadroen
Amsterdam
The Netherlands
31 20 5663330

Wetenschappelijk

Travel Clinic AMC, dept Tropical Medicine,
K R Gadroen
Amsterdam
The Netherlands
31 20 5663330

Deelname eisen

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

Adult travellers (18 years and above)
to high risk areas (north Africa, Middle East, Asia, South and Central America)
minimal 7 max 28 days travel.

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Use of antibiotics or probiotics up to 2 weeks before travelling
use of laxatives, acid blockers diarrhoea inhibitors
gastrointestinal disease, pregnancy/lactation, frequent travel to high risk area without having had diarrhoea.

Onderzoeksopzet

Opzet

Type:	Interventie onderzoek
Onderzoeksmodel:	Parallel
Toewijzing:	Gerandomiseerd
Blinding:	Dubbelblind
Controle:	Placebo

Deelname

Nederland
Status: Werving gestopt
(Verwachte) startdatum: 02-01-2007
Aantal proefpersonen: 800
Type: Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Positief advies
Datum: 01-10-2007
Soort: Eerste indiening

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
NTR-new	NL1043
NTR-old	NTR1077
Ander register	: M 06/291
ISRCTN	ISRCTN76793515

Resultaten

Samenvatting resultaten

N/A