

Psychotherapie voor residuele depressie na eerdere behandeling: effectiviteit, terugvalpreventie en veranderingsmechanismen

Gepubliceerd: 05-12-2006 Laatste bijgewerkt: 09-05-2024

Het vergelijken van de effectiviteit van CGT versus IPT in de preventie van toekomstige terugval onder residueel depressieve patiënten die eerder behandeling ontvingen. Onze onderzoeksvragen: zijn CGT en IPT na eerdere behandeling effectieve...

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving gestart
Type aandoening	Stemmingsstoornissen en -afwijkingen NEG
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

ID

NL-OMON30225

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

Psychotherapie voor residuele depressie na eerdere behandeling

Aandoening

- Stemmingsstoornissen en -afwijkingen NEG

Synoniemen aandoening

depressie, stemmingsstoornis

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Universiteit Maastricht

Overige ondersteuning: Ministerie van OC&W

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: cognitieve gedragstherapie, depressie, terugvalpreventie, veranderingsmechanismen

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Depressieve terugval/terugkeer in de loop van twee jaar.

Secundaire uitkomstmaten

Ernst van depressieve symptomen; depressieve episodes volgens de DSM-IV; andere

As I en As II stoornissen volgens de DSM-IV; psychologische problemen;

gezondheidszorgconsumptie; sociaal functioneren; patiëntperspectieven;

veranderingsmechanismen (expliciete en impliciete maten); genetisch materiaal

(wangslijmvlies).

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Alhoewel psychotherapie en antidepressiva aanvankelijk lijken te helpen, hebben veel depressieve patiënten op termijn last van terugval in een depressieve episode. Recente gegevens suggereren dat cognitieve gedragstherapie (CGT) dat risico op de lange termijn kan verminderen, maar de onderliggende veranderingsmechanismen die terugval voorkómen zijn nog steeds onbekend. Wij zullen de eersten zijn die onderzoek doen naar de effectiviteit van CGT in vergelijking met interpersoonlijke therapie (IPT) voor residuele depressie na eerdere behandeling en de onderliggende veranderingsmechanismen (expliciete en impliciete maten).

Doel van het onderzoek

Het vergelijken van de effectiviteit van CGT versus IPT in de preventie van toekomstige terugval onder residueel depressieve patiënten die eerder behandeling ontvingen. Onze onderzoeksvragen: zijn CGT en IPT na eerdere behandeling effectieve interventies die terugval en terugkeer van depressie voorkómen op de lange termijn? Wat zijn de onderliggende

veranderingsmechanismen in CGT, vergeleken met IPT? Wordt de korte en lange termijn werkzaamheid van CGT en IPT door variaties in genetische polymorfismen beïnvloed?

Onderzoeksopzet

Gerandomiseerd experiment met drie groepen: CGT (n=75), IPT (n=75) en een wachtlijst conditie van 8 weken (n=30)

Onderzoeksproduct en/of interventie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) en interpersoonlijke therapie (IPT). CGT en IPT zullen worden aangeboden op onze klinische werkplaats (Riagg Maastricht). Beide interventies zijn uitgeschreven in een behandelprotocol, zullen worden uitgevoerd door gekwalificeerde therapeuten en zullen beiden uit 18 sessies en twee boostersessies bestaan.

Inschatting van belasting en risico

Deelnemers zullen het onderzoekscentrum twee keer moeten bezoeken, en zullen ongeveer 20 uur moeten spenderen aan het invullen van vragenlijsten of geïnterviewd worden in de loop van 24 maanden. Onderdeel van de metingen is een klinisch interview aan het begin en het einde van de studie, en een computertaak in ons observatielaboratorium. Er zijn geen risico's verbonden aan deelname.

Contactpersonen

Publiek

Universiteit Maastricht

Postbus 616
6200 MD Maastricht
NL

Wetenschappelijk

Universiteit Maastricht

Postbus 616
6200 MD Maastricht
NL

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Volwassenen (18-64 jaar)

65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

depressieve symptomen (BDI > 10)

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

huidige behandeling voor depressieve symptomen

Onderzoeksopzet

Opzet

Type:	Interventie onderzoek
Onderzoeksmodel:	Parallel
Toewijzing:	Gerandomiseerd
Blinding:	Open / niet geblindeerd
Controle:	Geneesmiddel
Doel:	Algemeen wetenschappelijk

Deelname

Nederland
Status: Werving gestart
(Verwachte) startdatum: 01-02-2007
Aantal proefpersonen: 180
Type: Werkelijke startdatum

In onderzoek gebruikte producten en hulpmiddelen

Registratie: Geen registratie

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO
Datum: 05-12-2006
Soort: Eerste indiening
Toetsingscommissie: METC academisch ziekenhuis Maastricht/Universiteit Maastricht, METC azM/UM (Maastricht)

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL14107.068.06