

Effectiviteit van Triple P opvoedingsondersteuning in de setting van de Nederlandse Jeugdgezondheidszorg: een gerandomiseerd interventieonderzoek

Gepubliceerd: 25-11-2008 Laatste bijgewerkt: 08-05-2024

Determine the effectiveness of Triple P, level 3, in Dutch PCH. Bepalen van de effectiviteit van Triple P, niveau 3 voor milde psychosociale problematiek gedetecteerd en uitgevoerd binnen de setting van de Nederlandse JeugdGezondheidsZorg.

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving gestopt
Type aanpak	Leeftijdsgebonden factoren
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

ID

NL-OMON31309

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

Effectiviteit van Triple P

Aandoening

- Leeftijdsgebonden factoren

Synoniemen aanpak

kind emotionele & gedragsproblematiek; psychosociale problematiek

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Universitair Medisch Centrum Groningen

Overige ondersteuning: ZonMw

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: geestelijke gezondheid, gerandomiseerde interventie, jeugdgezondheidszorg, opvoedingsondersteuning, preventie, psychosociale problematiek

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Verandering van psychosociale problematiek gemeten met de Strengths & Difficulties Questionnaire, en de Eyberg Child Behaviour Inventory.

Secundaire uitkomstmaten

Verandering in gedrag vn ouders: Parenting Scale Inventory (discipline styles zoals laxheid, overreactiviteit en onderhandeling), Problem Setting and Behavior Checklist (opvoedcompetentie), Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (opvoedingsstress), Depression Anxiety Stress Scales (depressie en -stresssymptomen).

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Psychosociale problematiek zoals angst en depressie komen veel voor op de kinderleeftijd en kunnen leiden tot beperking in het dagelijks functioneren. De Nederlandse JeugdGezondheidsZorg kan een rol spelen in de preventie door vroegsignalering en -behandeling, aangezien meer dan 90% de JeugdGezondheidsZorg bezoekt voor periodiek geneeskundig onderzoek. De Triple P opvoedingsinterventie voorziet in de behoefte van de JeugdGezondheidsZorg aan een opvoedingsondersteuningsprogramma van beperkte omvang tbv milde psychosociale problematiek. De effectiviteit van deze interventie is nog onvoldoende bekend.

Doel van het onderzoek

Determine the effectiveness of Triple P, level 3, in Dutch PCH.

Bepalen van de effectiviteit van Triple P, niveau 3 voor milde psychosociale problematiek gedetecteerd en uitgevoerd binnen de setting van de Nederlandse JeugdGezondheidsZorg.

Onderzoeksopzet

Randomised controlled trial.

Onderzoeksproduct en/of interventie

Vier korte (20-30 minuten) consulten door een getrainde Jeugdverpleegkundige, volgens Triple P niveau 3. De interventie beoogt inventarisatie en omgaan met de problematiek, alsmede monitoring van de problematiek

Inschatting van belasting en risico

Het onderzoek bestaat uit 4 meetmomenten van elk ca. 1 uur over een 12 maandenperiode: voor de interventie, direct na afronding van de interventie, en 6 en 12 maanden na afronden van de interventie. Er zijn geen noemenswaardige risico's verbonden aan de interventie.

Contactpersonen

Publiek

Universitair Medisch Centrum Groningen

Postbus 196
9700 AD Groningen
NL

Wetenschappelijk

Universitair Medisch Centrum Groningen

Postbus 196
9700 AD Groningen
NL

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Volwassenen (18-64 jaar)

65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

1. Ouders van 9-11 jaar oude kinderen
2. Score in the subklinische range, i.e. 10-14 op de Strengths & Difficulties Questionnaire (SDQ)

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

1. A diagnose van ontwikkelingsachterstand, ontwikkelingsstoornis (bijv. autisme), gedragsstoornis of ADHD.
2. Onder behandeling voor gedragsproblematiek.
3. Chronische aandoening waarvoor 3 of meer medische consultaties in de afgelopen 6 maanden.
4. In de afgelopen 6 maanden echtscheiding van de ouders, overlijden of ernstige ziekte van iemand aan wie het kind gehecht was.
5. Ouders onder psychotherapeutische behandeling vanwege persoonlijke of relationele problematiek.
6. Ouders onvoldoende vaardig in het Nederlands.
7. Ernstige of gegeneraliseerde psychosociale problematiek van het kind dat buiten het indicatiegebied valt van Triple P niveau 3.
8. Verdenking op kindermishandeling, psychiatrische problematiek of verslaving van de ouders.

Onderzoeksopzet

Opzet

Type:	Interventie onderzoek
Onderzoeksmodel:	Anders
Toewijzing:	Gerandomiseerd
Blinding:	Dubbelblind
Controle:	Geneesmiddel
Doel:	Preventie

Deelname

Nederland	
Status:	Werving gestopt
(Verwachte) startdatum:	01-01-2008
Aantal proefpersonen:	162
Type:	Verwachte startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO	
Soort:	Eerste indiening
Toetsingscommissie:	METC Universitair Medisch Centrum Groningen (Groningen)

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL18454.042.07