

Effectiviteit van ambulante schemagerichte groepstherapie voor patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis: een pilotstudie

Gepubliceerd: 28-05-2008 Laatste bijgewerkt: 15-05-2024

Het doel van de huidige studie is de (kosten)effectiviteit van ambulante SFT-groepsbehandeling te vergelijken met de ambulante individuele SFT-behandeling zoals deze is gegeven in het kader van de eerder genoemde studie.

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving gestart
Type aandoening	Persoonlijkeids- en gedragsstoornissen
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

ID

NL-OMON31733

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

Ambulante groeps SFT voor BPS

Aandoening

- Persoonlijkeids- en gedragsstoornissen

Synoniemen aandoening

borderline persoonlijkheidsstoornis (borderline)

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: riagg-Maastricht

Overige ondersteuning: Ministerie van OC&W

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: behandel effectiviteit, Borderline persoonlijkheidsstoornis, Groepstherapie, Schemagerichte therapie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Semi-gestructureerd interview: Borderline Personality Disorder Severity

Index-IVth edition (BPDSI-IV).

Metingen vinden plaats voor aanvang van therapie, en na start van de therapie

ieder half jaar tot een half jaar na afloop van de groepstherapie.

Secundaire uitkomstmaten

Zelfrapportagevragenlijsten betreffende kwaliteit van leven (EuroQuOL en

WhoQol), algemeen psychopathologisch disfunctioneren (SCL-90), specifieke

SFT-concepten (Young Schema Vragenlijst en Schema Modi Inventory-Revised).

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

De huidige studie is een vervolg op een eerdere effectstudie naar de ambulante behandeling van borderline persoonlijkheidsstoornissen (BPS) met schemafocused therapie (SFT), zoals gepresenteerd door Giesen-Bloo et al (2006). Hierbij is gebleken dat schemafocused therapie een bewezen zinvolle en effectieve behandeling voor BPS is. De behandeling kan leiden tot aantoonbaar minder borderline-specifieke symptomatologie en afname van het algemeen psychopathologisch disfunctioneren. Omdat de behandeling kostbaar en tijdsintensief is, is de behandeling niet algemeen toegankelijk voor een grote groep patiënten met BPS. Om aan de grote vraag naar schemafocused therapie te beantwoorden, wordt SFT inmiddels in verschillende instellingen in Nederland in groepsverband aangeboden. Het effect hiervan is nog niet of nauwelijks onderzocht.

Doel van het onderzoek

Het doel van de huidige studie is de (kosten)effectiviteit van ambulante SFT-groepsbehandeling te vergelijken met de ambulante individuele SFT-behandeling zoals deze is gegeven in het kader van de eerder genoemde studie.

Onderzoeksopzet

Het betreft een pilotstudie naar de behandel-effectiviteit: two group design waarin historische data van de individuele SFT-behandeling worden vergeleken met de te verzamelen data van groeps-SFT in de huidige studie.

Onderzoeksproduct en/of interventie

Patiënten ontvangen voor de duur van twee jaar eenmaal per week groepstherapie, naast een individuele sessie per week (zolang nodig is om de groepstherapie te faciliteren, deze individuele sessies zullen zo snel mogelijk worden afgebouwd). Beide werken met een schemafocused aanpak en zullen op elkaar afgestemd worden door middel van twee wekelijkse intervisie.

Inschatting van belasting en risico

Over een termijn van 30 maanden worden 6 metingen verricht, die afzonderlijk ongeveer 6 uur duren. Een meting wordt opgedeeld in twee afspraken. De totale belasting komt daarmee op 36 uur. Aan het vragenlijstonderzoek zijn geen risico's verbonden.

Contactpersonen

Publiek

riagg-Maastricht

parallelweg 45-47
6221 BD Maastricht
NL

Wetenschappelijk

riagg-Maastricht

parallelweg 45-47
6221 BD Maastricht
NL

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Volwassenen (18-64 jaar)

65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

Borderline persoonlijkheidsstoornis, zoals geobjectiveerd dmv afname van (semi-gestructureerd interview) de borderline personality disorder severity index-IVth edition (score >20)

Goede beheersing Nederlandse taal

18-60 jaar

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Diagnose van stoornissen die interfereren met de reguliere of groepsbehandeling: psychotische stoornissen, subthreshold anti-sociale of narcistische persoonlijkheidsstoornis, verslaving die detoxificatie behoeft, mentale retardatie

Onderzoekopzet

Opzet

Fase onderzoek:	2
Type:	Interventie onderzoek
Blinding:	Open / niet geblindeerd
Controle:	Geen controle groep

Doel: Behandeling / therapie

Deelname

Nederland
Status: Werving gestart
(Verwachte) startdatum: 04-09-2008
Aantal proefpersonen: 20
Type: Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO
Datum: 28-05-2008
Soort: Eerste indiening
Toetsingscommissie: METC academisch ziekenhuis Maastricht/Universiteit Maastricht, METC azM/UM (Maastricht)

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

ID: 26741
Bron: Nationaal Trial Register
Titel:

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL20841.068.07
Ander register	nog niet toegekend
OMON	NL-OMON26741