

Effect van Bekkenfysiotherapie bij Patienten met Chronische Testiculaire Pijn en Hypertonie van de Bekkenbodem

Gepubliceerd: 26-10-2009 Laatst bijgewerkt: 04-05-2024

Het bepalen van het effect van bekkenfysiotherapie op chronische testiculaire pijn en op begeleidende klachten. Het bepalen van het effect van bekkenfysiotherapie op de hoogte van de tonus van de bekkenbodem. Meer inzicht geven in de...

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving gestopt
Type aandoening	Urinewegen tekenen en symptomen
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, met invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON32929

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

Bekkenfysiotherapie bij Chronische Testiculaire Pijn

Aandoening

- Urinewegen tekenen en symptomen

Synoniemen aandoening

Balpijn, Scrotalgie

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Leids Universitair Medisch Centrum

Overige ondersteuning: budget van de afdeling

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: Bekkenbodemp, CPPS, Fysiotherapie, Scrotalgie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Uitkomsten van de PelFIs

EMG meting van de bekkenbodemp in microvolts

Secundaire uitkomstmaten

nvt

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Er is behoefte aan een non-invasieve, definitieve behandeling van patiënten met chronische testiculaire pijn bij wie geen pathologie kan worden aangetoond middels standaard diagnostisch onderzoek.

Doel van het onderzoek

Het bepalen van het effect van bekkenfysiotherapie op chronische testiculaire pijn en op begeleidende klachten. Het bepalen van het effect van bekkenfysiotherapie op de hoogte van de tonus van de bekkenbodemp. Meer inzicht geven in de behandelingsmogelijkheden van patiënten met chronische scrotale pijn.

Onderzoekopzet

Patiënten met chronische testiculaire pijn die zijn behandeld door de bekkenfysiotherapeut worden schriftelijk opgeroepen voor een consult bij de bekkenfysiotherapeut. Deze neemt een vragenlijst (PelFIs) af en een EMG meting van de bekkenbodemp wordt uitgevoerd op de polikliniek Urologie in het LUMC. Deze resultaten worden vergeleken met de uitkomsten van de vragenlijst en de EMG meting van voor de behandeling door de bekkenfysiotherapeut

Inschatting van belasting en risico

Patiënten ondergaan een EMG registratie middels een anale probe. Dit onderzoek is standaard binnen de bekkenfysiotherapie, en patiënten hebben dit onderzoek dus al eens ondergaan.

Contactpersonen

Publiek

Leids Universitair Medisch Centrum

Postbus 9600
2300 RC Leiden
Nederland

Wetenschappelijk

Leids Universitair Medisch Centrum

Postbus 9600
2300 RC Leiden
Nederland

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Volwassenen (18-64 jaar)
65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

Alle mannen met chronische testiculaire pijn die vanaf oktober 2005 door de afdeling urologie in het LUMC zijn doorverwezen naar de bekkenfysiotherapeut en die een

diagnostisch onderzoek van de bekkenbodem functie hebben gehad

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Tussentijds aangetoonde pathologie welke een verklaring is voor de klachten en/of andere ontstane pathologie in dit gebied

Onderzoeksopzet

Opzet

Type: Observationeel onderzoek, met invasieve metingen

Blinding: Open / niet geblindeerd

Controle: Geen controle groep

Doel: Behandeling / therapie

Deelname

Nederland

Status: Werving gestopt

(Verwachte) startdatum: 26-10-2009

Aantal proefpersonen: 0

Type: Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO

Datum: 26-10-2009

Soort: Eerste indiening

Toetsingscommissie: METC Leids Universitair Medisch Centrum (Leiden)

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL28448.058.09