

De ziekte van Behcet: op welke manier is de ziekte van Behcet actief bij patienten in Nederland in vergelijking met patienten in Turkije en de Verenigde Staten

Gepubliceerd: 23-03-2009 Laatste bijgewerkt: 06-05-2024

Vergelijken van de ernst van de activiteit en schade bij patienten met de ziekte van Behcet in Nederland en de Verenigde Staten en Turkije.

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving gestart
Type aandoening	Auto-immuunziekten
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON33363

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

Behcet studie

Aandoening

- Auto-immuunziekten

Synoniemen aandoening

Behcet syndroom, Ziekte van Behcet

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Investigator driven onderzoek, Prof B.A.C Dijkmans is hoofd van onze

groep

Overige ondersteuning: volgt

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: genetics, observationele studie, vragenlijsten, Ziekte van Behcet

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

klinische uitkomst maten: intensiteit/activiteit van de ziekte volgens het

current activity form

verschillende orgaan betrokkenheid, prevalenties

westers-niet westers vergelijken

als uitgewerkt voorbeeld:

percentage patienten met uveitis

percentage patienten met volledige blindheid tgv uveitis

percentage patienten met verminderde visus tgv uveitis

deze prevalenties vergelijken tussen Nederland, VS en Turkije, ook westers (NL

en VS) versus niet westers (Turkije)

Secundaire uitkomstmaten

niet van toepassing

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

De ziekte van Behçet is een complexe auto inflammatoire ziekte waarbij veel organen aangedaan kunnen zijn. Vrijwel altijd zijn er recidiverende orale ulcera als klacht. Op dit moment worden patienten met de ziekte van Behçet

geincludeerd in onderzoek indien ze voldoen aan internationaal vastgestelde criteria, de zogenaamde ISF criteria.

Het beloop van patiënten met de ziekte van Behçet is sterk wisselend, variërend van patiënten met vooral mucocutane betrokkenheid tot levensbedreigende vasculaire of neurologische complicaties. Er zijn aanwijzingen dat de ziekte van Behçet in Westerse landen een milder beloop heeft in vergelijking met het beloop bij patiënten in niet-westerse landen. Voor oogcomplicaties zoals blindheid is dit recent duidelijk geworden.

Doel van het onderzoek

Vergelijken van de ernst van de activiteit en schade bij patiënten met de ziekte van Behçet in Nederland en de Verenigde Staten en Turkije.

Onderzoeksopzet

Observationeel, cross/sectioneel.

Inschatting van belasting en risico

nvt

Contactpersonen

Publiek

Investigator driven onderzoek, Prof B.A.C Dijkmans is hoofd van onze groep

Jan van Breemen straat 2
1056 AB
NL

Wetenschappelijk

Investigator driven onderzoek, Prof B.A.C Dijkmans is hoofd van onze groep

Jan van Breemen straat 2
1056 AB
NL

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Volwassenen (18-64 jaar)

65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

Volwassen patienten met de ziekte van Behcet die voldoen aan de internationale criteria voor deze ziekte.

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

geen

Onderzoeksopzet

Opzet

Type: Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Blinding: Open / niet geblindeerd

Controle: Geen controle groep

Doel: Algemeen wetenschappelijk

Deelname

Nederland

Status: Werving gestart

(Verwachte) startdatum: 10-09-2009

Aantal proefpersonen: 50

Type: Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO

Datum: 23-03-2009

Soort: Eerste indiening

Toetsingscommissie: METC Amsterdam UMC

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL27010.048.09