

Ondoordachte impulsiviteit en beloningsgevoeligheid als voorspellers van behandeluitkomst in verslaving

Gepubliceerd: 18-01-2010 Laatste bijgewerkt: 04-05-2024

Doelen:-bijdragen aan het begrip van de concepten Ondoordachte impulsiviteit en Beloningsgevoeligheid door ze te onderzoeken in een klinische populatie; m.a.w.: zijn deze concepten ook valide in een klinische populatie?-onderzoeken of Ondoordachte...

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving gestart
Type aandoening	Overige aandoening
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON33386

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

impulsiviteit en beloningsgevoeligheid in behandeling van verslaving

Aandoening

- Overige aandoening

Synoniemen aandoening

afhankelijkheid van een middel, verslaving

Aandoening

verslaving

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Erasmus Universiteit Rotterdam

Overige ondersteuning: Ministerie van OC&W

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: behandeling, beloning, impulsiviteit, verslaving

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

uitval uit behandeling. Deze uitval is gedefinieerd als het aantal weken dat een deelnemer verblijft op de afdeling Rehabilitatie van de kliniek. De cut-off score is bepaald op 30 dagen en deelnemers zullen worden toegewezen aan een van de twee ontstane groepen. Een groep bestaat uit uitvallers; de andere uit deelnemers die het langer volhouden.

Secundaire uitkomstmaten

Naast bovenstaande uitkomstmaat, zal (het gebrek aan) behandel succes geoperationaliseerd worden als de tijd tot het moment van uitval. Zodoende kan mogelijk inzicht gekregen worden in specifieke 'uitvalpatronen'.

Ten derde zal drie maanden na de eerste meting de sectie 'alcohol- en druggebruik' van het semi-gestructureerde interview ASI nogmaals worden afgenomen. Hiermee kan de relatieve verandering in het gebruik van verslavende middelen worden onderzocht.

Ten vierde wordt, tijdens de klinische opname, middels dossieronderzoek gekeken wat de uitslagen zijn van reguliere urinecontroles en of patiënten in de

behandeling rapporteren terug te zijn gevallen in middelengebruik. Ook deze twee maten zijn indicatoren van het welslagen van de behandeling.

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Het misbruik van middelen is een groot, wereldwijd probleem. Het is een probleem vanwege de grote medische kosten, het verlies aan productiviteit en de bijkomende criminaliteit. Daarnaast kan de grote emotionele last voor de verslaafde en zijn omgeving niet in geld worden uitgedrukt.

De enorme onvang van de problemen die veroorzaakt worden door verslavende middelen, maakt onderzoek naar de behandeling van verslaving zeer relevant. De behandeling van verslavingsproblemen is moeilijk gebleken. Verslaafden willen regelmatig niet behandeld worden, en zelfs wanneer ze wel behandeld worden, zijn de resultaten vaak beperkt. Hoewel patiënten gemotiveerd kunnen lijken, vallen ze vaak terug in middelengebruik en stoppen hun behandeling voortijdig. Dit laatste is een belangrijk gegeven, omdat het afmaken van een behandeling gerelateerd is aan abstinentie. Het is erg belangrijk om te proberen factoren te identificeren die de uitkomst van de behandeling van verslaving kunnen voorspellen. Als er inzicht komt in het tot stand komen van het welslagen van een behandeling, wordt het mogelijk om rekening te houden met individuele verschillen bij het opstellen van behandelplannen van individuele patiënten. Integraal onderzoek naar de voorspellende waarde van het veelbelovende twee-factorenmodel van impulsiviteit (geconceptualiseerd door Loxton en collega's en Franken & Muris) in de behandeling van verslaafden, is nog niet gedaan.

In het huidige onderzoek zullen Ondoordachte impulsiviteit en Beloningsgevoeligheid (de twee factoren in het hierbovengenoemde model) gebruikt worden als voorspellers van behandeluitkomst in verslaving.

Doel van het onderzoek

Doelen:

- bijdragen aan het begrip van de concepten Ondoordachte impulsiviteit en Beloningsgevoeligheid door ze te onderzoeken in een klinische populatie; m.a.w.: zijn deze concepten ook valide in een klinische populatie?
- onderzoeken of Ondoordachte impulsiviteit en Beloningsgevoeligheid behandeluitkomst voorspellen en diens gevolge belangrijke factoren zijn in de diagnostiek en behandeling van verslaafden

Onderzoeksvragen:

- Zijn Ondoordachte impulsiviteit en beloningsgevoeligheid te onderscheiden

variablen in een klinische populatie?

-Hebben Ondoordachte impulsiviteit en Beloningsgevoeligheid voorspellende waarde in de behandeling van verslaving, onafhankelijk van elkaar?

Hypothesen:

-Volgens de theorie van Dawe, Gullo en Loxton (2004) kan er worden verwacht dat Ondoordachte impulsiviteit en Beloningsgevoeligheid te onderscheiden variabelen zijn.

-Ondoordachte impulsiviteit is een voorspeller van behandeluitkomst: patiënten die hoog scoren op deze variabele presteren slechter in behandeling.

-Hoge niveaus van Beloningsgevoeligheid zijn voorspellend voor uitval uit behandeling

Onderzoeksopzet

Deelnemers zijn patiënten die opgenomen zijn in de Boumankliniek, een faciliteit van Bouman GGZ in Rotterdam. Patiënten worden geselecteerd en gevraagd om deel te nemen wanneer ze verblijven op de Detox-afdeling. Na hun detoxificatie zullen deelnemers overgeplaatst worden naar de afdeling Rehabilitatie. Deelnemers worden gevraagd vragenlijsten in te vullen, ze worden geïnterviewd en neuropsychologisch getest; dit alles gedurende hun eerste drie dagen op de afdeling Rehabilitatie. Gedurende hun verblijf op de Afdeling Rehabilitatie worden patiënten gevolgd.

Drie maanden na de eerste meting worden deelnemers nogmaals geïnterviewd, om te onderzoeken hoe de status is van hun middelengebruik.

Inschatting van belasting en risico

niet van toepassing

Contactpersonen

Publiek

Erasmus Universiteit Rotterdam

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
NL

Wetenschappelijk

Erasmus Universiteit Rotterdam

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
NL

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Volwassenen (18-64 jaar)
65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

mannnelijk, middelenaafhankelijk, opgenomen patient in een verslavingskliniek

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

ernstige bijkomende interfererende psychiatrische stoornissen (acute stemmingsstoornissen, acute psychotische stoornissen en neuropsychiatrische aandoeningen)

Onderzoeksopzet

Opzet

Type: Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Blinding: Open / niet geblindeerd

Controle: Geen controle groep

Doel: Diagnostiek

Deelname

Nederland	
Status:	Werving gestart
(Verwachte) startdatum:	01-02-2010
Aantal proefpersonen:	60
Type:	Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO	
Datum:	18-01-2010
Soort:	Eerste indiening
Toetsingscommissie:	METC Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam (Rotterdam)

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL28815.078.09