

Trauma-herinneringen, Stress en Craving bij Patienten met Middelenafhankelijkheid en een Traumatische Voorgeschiedenis.

Gepubliceerd: 16-03-2009 Laatste bijgewerkt: 09-11-2024

Ontlokken trauma-cues sterkere craving bij individuen met middelenafhankelijkheid en PTSS in vergelijking tot middelenafhankelijke patiënten zonder PTSS? Zo ja, treedt dit effect alleen op in geval van blootstelling aan het trauma, of blijken...

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Beëindigd
Type aandoening	Overige aandoening
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, met invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON34014

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

Verband tussen Trauma-herinneringen, Stress en Craving.

Aandoening

- Overige aandoening
- Angststoornissen en -symptomen

Synoniemen aandoening

Post Traumatische Stress Stoornis, Verslaving

Aandoening

middelenafhankelijkheid

Betreft onderzoek met

Ondersteuning

Primaire sponsor: Mondriaan Zorggroep (Heerlen)

Overige ondersteuning: De zorginstelling waar het onderzoek plaatsvindt; financiert het onderzoek

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: Craving, Middelenafhankelijkheid, Stress, Trauma

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Subjectief ervaren craving.

Secundaire uitkomstmaten

niet van toepassing

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Veel studies hebben aangetoond dat er een sterke relatie bestaat tussen middelenafhankelijkheid en Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Volgens de zelf-medicatie-hypothese heeft het gebruik van middelen bij deze patiënten de functie om de symptomen van PTSS te verminderen. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat traumatische herinneringen craving kunnen oproepen bij PTSS-patiënten met cocaïne-, nicotine- en/ of alcoholafhankelijkheid. De huidige studie heeft een andere opzet en zucht wordt gemeten na blootstelling aan neutrale cues, trauma cues en stress cues. De hypothese is dat proefpersonen met veel PTSS-symptomen meer subjectieve craving zullen ervaren na blootstelling aan de trauma en stress cues dan proefpersonen zonder PTSS.

Doel van het onderzoek

Ontlokken trauma-cues sterkere craving bij individuen met middelenafhankelijkheid en PTSS in vergelijking tot middelenafhankelijke patiënten zonder PTSS? Zo ja, treedt dit effect alleen op in geval van blootstelling aan het trauma, of blijken patiënten met afhankelijkheid en PTSS over het algemeen gevoeliger voor stress en vertonen zij dus ook sterkere

craving bij blootstelling aan stressvolle situaties die niets van doen hebben met het trauma?

Onderzoeksopzet

Het betreft hier een PTSS (wel vs. niet) x CUE (trauma, stress, of neutraal) quasi-experimenteel factorieel design, met ervaren craving als de primaire afhankelijke variabele.

Inschatting van belasting en risico

Proefpersonen kunnen craving of spanning ervaren nadat ze worden blootgesteld aan een ingesproken tekst over hun eigen traumatische ervaring. Deelname aan het onderzoek kan daarom moeilijk zijn. Op pagina 25 van het onderzoeksprotocol worden de maatregelen beschreven die genomen zijn om de lasten van het onderzoek te beperken. Deelname aan het onderzoek kost ook tijd. Patiënten zullen in totaal drie uur doorbrengen in de testruimte. Ze worden gedurende drie sessies getest en elke sessie wordt ongeveer een week na de vorige sessie ingepland. Na de blootstelling aan de cues, wordt aan de proefpersonen gevraagd om hun mate van craving en spanning aan te geven. Hiervoor wordt een gestandaardiseerde vragenlijst gebruikt.

Aangezien dit onderzoek gaat over traumaherinneringen bij verslaafden, kunnen enkel patiënten als proefpersonen geïnccludeerd worden.

Contactpersonen

Publiek

Mondriaan Zorggroep (Heerlen)

J. F. Kennedylaan 305
6419 XZ Heerlen
Nederland

Wetenschappelijk

Mondriaan Zorggroep (Heerlen)

J. F. Kennedylaan 305
6419 XZ Heerlen
Nederland

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Volwassenen (18-64 jaar)

65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

- individuen met middelenafhankelijkheid
- geschiedenis van trauma
- behandeld worden in een klinische setting voor middelenafhankelijkheid
- volledig abstinente zijn voor minstens 20 dagen

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

- psychotische stoornis
- zwakbegaafdheid
- risico voor suïcidaliteit of automutilatie
- anti-craving medicatie slikken
- geen craving rapporteren in de laatste drie weken
- terugval in de week voor het experiment

Onderzoeksopzet

Opzet

Type: Observationeel onderzoek, met invasieve metingen

Blinding: Open / niet geblindeerd

Controle: Geen controle groep

Doel: Anders

Deelname

Nederland

Status: Beëindigd

(Verwachte) startdatum: 28-04-2009

Aantal proefpersonen: 100

Type: Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO

Datum: 16-03-2009

Soort: Eerste indiening

Toetsingscommissie: METC Z: Zuyderland-Zuyd (Heerlen)

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL25550.096.09