

De effecten van filaggrine deficientie op sensibilisatiepatronen, ernst en kwaliteit van leven in patiënten met atopisch eczeem

Gepubliceerd: 03-02-2012 Laatste bijgewerkt: 29-04-2024

Het doel van deze studie is het analyseren van de effecten van filaggrine deficientie op eczeem en andere atopische aandoeningen samen met hun serologische parameters.

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving nog niet gestart
Type aandoening	Epidermale en dermale aandoeningen
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, met invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON35846

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

FILATOP

Aandoening

- Epidermale en dermale aandoeningen

Synoniemen aandoening

constitutioneel eczeem, dauwworm

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam

Overige ondersteuning: Ministerie van OC&W

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: Atopisch eczeem, Filaggrine, Raman, Sensibilisatie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Correlatie tussen filaggrinedeficientie en specifieke sensibilisatie voor inhalatieallergenen.

Secundaire uitkomstmaten

Het relateren van filaggrine deficiëntie aan ernst en klachten bij atopisch eczeem en kwaliteit van leven.

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Filaggrinedeficientie is de belangrijkste oorzaak van atopisch aandoeningen. Het is de sterkste risicofactor voor atopisch eczeem en de geassocieerde atopische mars en specifieke symptomen zoals jeuk. Er is steeds meer bewijs dat deficiëntie van filaggrine tot verstoorde barrierefunctie van de huid leidt wat aanleiding geeft tot ontwikkeling van atopisch eczeem. Er is echter nog geen directe link gelegd tussen sensibilisatie voor inhalantallergenen en filaggrinedeficientie.

Doel van het onderzoek

Het doel van deze studie is het analyseren van de effecten van filaggrine deficiëntie op eczeem en andere atopische aandoeningen samen met hun serologische parameters.

Onderzoeksopzet

Dit is een exploratoir cohortonderzoek waarin patienten met atopisch eczeem met en zonder filaggrinedeficientie met elkaar zullen worden vergeleken.

Inschatting van belasting en risico

Bleasting: 1 uur onderzoekstijd. Dit is eenmalig. Redelijkerwijs geen risico's.

Contactpersonen

Publiek

Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam

Burg. s" Jacobplein 51
3000 NL
NL

Wetenschappelijk

Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam

Burg. s" Jacobplein 51
3000 NL
NL

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Volwassenen (18-64 jaar)
65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

Patient is door een dermatoloog gediagnosticeerd met atopisch eczeem

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Patient weigert mee te doen
Patient kan Nederlands niet spreken of schrijven
Patient is jonger dan 18 jaar
Patient is niet te instrueren

Onderzoeksopzet

Opzet

Type: Observationeel onderzoek, met invasieve metingen

Blinding: Open / niet geblindeerd

Controle: Geen controle groep

Doel: Algemeen wetenschappelijk

Deelname

Nederland

Status: Werving nog niet gestart

(Verwachte) startdatum: 01-07-2011

Aantal proefpersonen: 100

Type: Verwachte startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO

Datum: 03-02-2012

Soort: Eerste indiening

Toetsingscommissie: METC Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam (Rotterdam)

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL36515.078.11