

Gerapporteerde psychotische ervaringen door adolescenten in de ambulante kinder-en jeugdpsychiatrie en de determinatie van een cut-off point op de ervaringenlijst (PQ-16).

Gepubliceerd: 20-02-2014 Laatste bijgewerkt: 24-04-2024

Het doel van het onderzoek is het bepalen van een cut-off score op de PQ-16 (ervaringenlijst) met de CAARMS (The Comprehensive Assessment of At Risk Mental States) voor adequatere detectie van adolescenten die een risico lopen op psychose. Tevens...

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving gestart
Type aandoening	Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON40304

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

Psychotische ervaringen in de adolescentie

Aandoening

- Schizofrenie en andere psychotische stoornissen

Synoniemen aandoening

Dingen horen, zien of voelen die andere mensen niet horen, zien of voelen. Buitengewoon opmerkelijke ervaringen.

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Parnassia Bavo Groep (Den Haag)

Overige ondersteuning: eigen exploitatie

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: adolescentie, psychose, risico op psychose, vroegdetectie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Sensitiviteit en specificiteit van de PQ-16 in het differentiëren tussen ultra high risk/psychose op de CAARMS en geen CAARMS diagnose.

Secundaire uitkomstmaten

Transitie van UHR naar niet-UHR gedurende een jaar follow up.

Invloed van variabelen op UHR/ niet-UHR

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Er is nog veel onduidelijk over de vroegsignalering van een psychose. Longitudinaal onderzoek heeft uitgewezen dat psychotische ervaringen op jongere leeftijd voorspellend zijn voor een psychose op latere leeftijd. Het belang van vroeginterventie om een psychose te voorkomen of uit te stellen is door meerdere onderzoekers aangetoond. Er is echter nog maar weinig bekend over welke signalen werkelijk een klinische psychose voorspellen en veel cliënten met een ultra hoog risico op psychose zullen geen psychose ontwikkelen. Hoewel de transitiecijfers bij adolescenten in de algemene populatie laag liggen, zijn deze relatief hoog in verwezen populaties. Ook adolescenten die geen transitie doormaken ervaren meer problemen en een lagere kwaliteit van leven. De vraag rijst welke cliënten binnen Lucertis behandeld moeten worden voor psychotische symptomen en welke adolescenten voldoende profiteren van een behandeling voor de diagnose van verwijzing zonder specifieke behandeling voor psychotische symptomen. Een ander probleem betreft het detecteren van deze jongeren

aangezien psychotische symptomen vaak worden gemist door de behandelaren.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is het bepalen van een cut-off score op de PQ-16 (ervaringenlijst) met de CAARMS (The Comprehensive Assessment of At Risk Mental States) voor adequatere detectie van adolescenten die een risico lopen op psychose. Tevens worden risicofactoren bepaald en wordt het verloop van de UHR status voor een jaar gevolgd.

Adequate detectie van adolescenten die behandeling nodig hebben voor psychotische ervaringen, doelt op doelgerichte behandeling zonder het behandelen van adolescenten die geen behandeling nodig hebben.

Onderzoeksopzet

Crossectioneel gecontroleerd enkelblind onderzoek en longitudinaal beschrijvend onderzoek.

Inschatting van belasting en risico

NVT

Contactpersonen

Publiek

Parnassia Bavo Groep (Den Haag)

Prins Constantijnweg 48 - 54
Rotterdam 3066TA
NL

Wetenschappelijk

Parnassia Bavo Groep (Den Haag)

Prins Constantijnweg 48 - 54
Rotterdam 3066TA
NL

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Adolescenten (12-15 jaar)

Adolescenten (16-17 jaar)

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

1. Adolescenten tussen 12-18 jaar die zijn verwezen naar 1 van drie locaties van Lucertis, kinder- en jeugdpsychiatrie, die
2. gediagnosticeerd zijn met een DSM-IV As I of II stoornis, die
3. positief scoren op 6 of meer items op de ervaringenlijst (PQ-16) en
- 4 die een UHR status scoren op de CAARMS (Comprehensive Assessment of at Risk Mental State; Yung et al. 2005), dit betreft het hebben van psychotische symptomen over langere tijd en een verminderd sociaal functioneren.

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

1. Huidig of voorgaand gebruik antipsychotische medicatie
2. Ernstige leerproblemen
3. Niet Nederlands sprekend
4. Geen As I of II stoornis
5. Een geschiedenis van psychose

Onderzoeksopzet

Opzet

Type: Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Blindering: Enkelblind

Controle:	Geen controle groep
Doel:	Diagnostiek

Deelname

Nederland	
Status:	Werving gestart
(Verwachte) startdatum:	20-02-2014
Aantal proefpersonen:	700
Type:	Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO	
Datum:	20-02-2014
Soort:	Eerste indiening
Toetsingscommissie:	METC Leiden-Den Haag-Delft (Leiden)
	metc-ldd@lumc.nl

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
ISRCTN	ISRCTN21353122
CCMO	NL44180.058.13