

Empathie & psychose

Gepubliceerd: 30-03-2015 Laatste bijgewerkt: 21-04-2024

Onderzoeken of empathie is aangedaan en zo ja, welke elementen van empathie zijn aangedaan bij mensen met schizofrenie en mensen die een verhoogd risico lopen om een psychose te ontwikkelen.

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving gestopt
Type aandoening	Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON44395

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

Empathie & psychose

Aandoening

- Schizofrenie en andere psychotische stoornissen

Synoniemen aandoening

psychose

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: Rijksuniversiteit Groningen

Overige ondersteuning: PPO; postmasteropleidingen psychologie Groningen

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: empathie, psychose, risicogroep, schizofrenie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Empathie, gemeten met de Empathic Accuracy Test, de Faux Pas Test, de Interpersonal Reactivity Index, de Questionnaire of Cognitive and Affective Empathy en de Metacognition Assessment Scale.

Secundaire uitkomstmaten

Sociaal functioneren, gemeten met de Time Use; inzicht, gemeten met de Beck Cognitive Insight Scale; depressie, gemeten met de Quick Inventory of Depressive Symptomatology; stigma, gemeten met de Internalized Stigma of Mental Illness Scale en kwaliteit van leven, gemeten met de Manchester Short Assessment of Quality of Life.

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Mensen met schizofrenie ervaren meerdere problemen op het gebied van sociaal functioneren. Empathie speelt hier mogelijk een belangrijke rol bij. Empathie kan worden verdeeld in affectieve en cognitieve empathie. Het is niet duidelijk welke aspecten van empathie aangedaan zijn bij mensen met schizofrenie. Deze studie is opgezet om te onderzoeken welke aspecten van empathie precies aangedaan zijn bij deze doelgroep. Mogelijk is het empathisch vermogen al aangedaan vóór het ontstaan van de psychose en kan empathie als belangrijke voorspeller van een psychose optreden. We willen daarom onderzoeken of empathie al is aangedaan in mensen die het risico lopen op een psychose (UHR groep).

Doel van het onderzoek

Onderzoeken of empathie is aangedaan en zo ja, welke elementen van empathie zijn aangedaan bij mensen met schizofrenie en mensen die een verhoogd risico lopen om een psychose te ontwikkelen.

Onderzoeksopzet

Case-control study.

Inschatting van belasting en risico

Het onderzoek duurt maximaal 2 uur waarbij een computertaak wordt uitgevoerd, drie interviews worden afgenomen en zes vragenlijsten worden beantwoord. Alle informatie wordt anoniem verwerkt. De deelnemer mag er ook voor kiezen het onderzoek in twee afspraken uit te voeren. De deelnemer mag voortijdig stoppen met het onderzoek mocht hij/zij dit toch als belastend ervaren.

Een belangrijke onderzoeksvraag is of empathie ook aangedaan is bij mensen die het risico lopen om een psychose te krijgen. De meeste mensen krijgen hun eerste psychose tussen hun 20ste en 25ste. Voortekenen doen zich soms al op jonge leeftijd voor. Bij GGZ Friesland worden daarom ook de jongeren vanaf 15 jaar die in behandeling komen gescreend of zij risico lopen op een psychose. Voor dit onderzoek willen we uitspraken kunnen doen over de gehele 'at risk' populatie en willen we daarom ook jongeren tussen 15 en 18 jaar meenemen.

Contactpersonen

Publiek

Rijksuniversiteit Groningen

Grote Kruisstraat 2/1
Groningen 9712 TS
NL

Wetenschappelijk

Rijksuniversiteit Groningen

Grote Kruisstraat 2/1
Groningen 9712 TS
NL

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Adolescenten (12-15 jaar)

Adolescenten (16-17 jaar)

Volwassenen (18-64 jaar)

65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

Patienten met schizofrenie;;- Diagnose schizofrenie of schizoaffectieve stoornis volgens DSM-IV-TR;

- In staat zijn informed consent te geven;
 - 18 jaar of ouder;
 - geen verandering in medicatie in de afgelopen 30 dagen;
 - lage metacognitie (groep 1) en hoge metacognitie (groep 2).;Patiënten in de UHR groep;;-
- Risico op psychose bepaald door genetische aanleg of door CAARMS;
- In staat zijn informed consent te geven;
 - Geen verandering in medicatie in de afgelopen 30 dagen.

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Alle deelnemers;;- Actieve psychose;

- Comorbide neurologische aandoening;
- Middelenafhankelijkheid (niet middelenmisbruik);
- IQ <70.

Onderzoeksopzet

Opzet

Type: Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Blinding: Open / niet geblindeerd

Controle: Geen controle groep

Doel: Diagnostiek

Deelname

Nederland	
Status:	Werving gestopt
(Verwachte) startdatum:	24-11-2016
Aantal proefpersonen:	90
Type:	Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO	
Datum:	30-03-2015
Soort:	Eerste indiening
Toetsingscommissie:	METC Universitair Medisch Centrum Groningen (Groningen)
Goedgekeurd WMO	
Datum:	27-09-2016
Soort:	Amendement
Toetsingscommissie:	METC Universitair Medisch Centrum Groningen (Groningen)

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
CCMO	NL49321.042.14