

# Het vóórkomen van rectale chlamydia bij vrouwen die getest worden voor genitale chlamydia in de huisartsenpraktijk.

Gepubliceerd: 15-06-2017 Laatste bijgewerkt: 13-04-2024

Vraagstellingen1. Hoe vaak komt het voor dat er een rectale chlamydia gevonden wordt bij vrouwen die getest worden voor een cervicale chlamydia in de huisartsenpraktijk ?2. Wat is de relatie tussen de seksuele anamnese en de resultaten van rectale...

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Ethische beoordeling</b> | Goedgekeurd WMO                                     |
| <b>Status</b>               | Werving gestopt                                     |
| <b>Type aandoening</b>      | Chlamydia-infectieziekten                           |
| <b>Onderzoekstype</b>       | Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen |

## Samenvatting

### ID

NL-OMON45697

### Bron

ToetsingOnline

### Verkorte titel

RECFEM

### Aandoening

- Chlamydia-infectieziekten

### Synoniemen aandoening

rectale chlamydia trachomatis infectie; rectale seksueel overdraagbare aandoening bij vrouwen

### Betreft onderzoek met

Mensen

### Ondersteuning

**Primaire sponsor:** Academische Huisartsenpraktijk Groningen

**Overige ondersteuning:** Ministerie van OC&W,AOF

## Onderzoeksproduct en/of interventie

**Trefwoord:** chlamydia trachomatis, gentiaal, huisartsenpraktijk, rectaal, vrouwen

## Uitkomstmaten

### Primaire uitkomstmaten

Prevalentie van een rectale infectie met Chlamydia bij vrouwen die een indicatie hadden voor een genitale Chlamydia test

De voorspellende waarde van de anamnese voor een rectale Chlamydia

### Secundaire uitkomstmaten

Geen

## Toelichting onderzoek

### Achtergrond van het onderzoek

Volgens de huidige NHG standaard, het soa-consult, is het advies, alleen rectaal te testen op chlamydia als er sprake is van rectale seks of van rectale klachten. De standaard adviseert een rectale chlamydia anders te behandelen dan een cervicale chlamydia. Huisartsen doen zeer weinig rectale soa testen. Het is aannemelijk dat ze te weinig rectaal testen. Uit onderzoek door van Liere et al. is gebleken dat op een soa poli in Zuid-Limburg bij 71 % van de vrouwen met een cervicale chlamydia ook een rectale chlamydia wordt gevonden. Dit bleek onafhankelijk van de seksuele anamnese of het hebben van rectale klachten. Deze uitkomst doet de vraag rijzen of het anamnese gestuurd rectaal testen bij vrouwen een adequate aanpak is. Al het onderzoek hiernaar is buiten de setting van de huisartsenpraktijk gedaan. Het is zeer de vraag of de populatie van de huisarts vergelijkbaar is met de populatie zie zich laat testen op soa poli\*s.

Onze hypothese is dat de anamnese volgens de NHG standaard niet voorspellend is voor een rectale chlamydia infectie.

### Doel van het onderzoek

Vraagstellingen

1. Hoe vaak komt het voor dat er een rectale chlamydia gevonden wordt bij vrouwen die getest worden voor een cervicale chlamydia in de huisartsenpraktijk?
2. Wat is de relatie tussen de seksuele anamnese en de resultaten van rectale testen op Chlamydia? Oftewel, is het bevestigend antwoorden van de vraag naar het hebben van rectale seks of rectale klachten voorspellend voor het hebben van een rectale chlamydia?

## **Onderzoeksopzet**

Cross sectioneel onderzoek

## **Inschatting van belasting en risico**

Van deelnemers aan het onderzoek wordt een tweetal dingen gevraagd:

1. Antwoord te geven op aanvullende vragen aangaande de seksuele anamnese:
2. Een rectale chlamydia test te verrichten. Dit is een zelftest, waarbij de patiënt een wattenstok anaal moet inbrengen en langs het rectum slijmvlies moet strijken.

Hier zijn geen risico's aan verbonden.

## **Contactpersonen**

### **Publiek**

Academische Huisartsenpraktijk Groningen

Oostersingel ingang 47 HPC XA-30  
Groningen 9700 AW  
NL

### **Wetenschappelijk**

Academische Huisartsenpraktijk Groningen

Oostersingel ingang 47 HPC XA-30  
Groningen 9700 AW  
NL

## Locaties

### Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

## Deelname eisen

### Leeftijd

Volwassenen (18-64 jaar)

65 jaar en ouder

### Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

Vrouwen > 18 jr

Heteroseksuele contacten

Indicatie voor genitale chlamydia test

Bereid tot rectale afname chlamydia test

Informed consent

### Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Onmogelijk om goede seksuele anamnese af te nemen door bijvoorbeeld taalprobleem, psychiatrische stoornis of cognitieve problemen

## Onderzoeksopzet

### Opzet

**Type:** Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Blinding: Open / niet geblindeerd

Controle: Geen controle groep

Doel: Diagnostiek

## Deelname

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Nederland               |                       |
| Status:                 | Werving gestopt       |
| (Verwachte) startdatum: | 14-09-2017            |
| Aantal proefpersonen:   | 500                   |
| Type:                   | Werkelijke startdatum |

## Ethische beoordeling

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Goedgekeurd WMO     |                                                         |
| Datum:              | 15-06-2017                                              |
| Soort:              | Eerste indiening                                        |
| Toetsingscommissie: | METC Universitair Medisch Centrum Groningen (Groningen) |

## Registraties

### Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

### Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

### In overige registers

| Register | ID             |
|----------|----------------|
| CCMO     | NL59591.042.17 |