

# Families in the Frontline 1.0: een evaluatie studie van Multi-familie therapie (MFT) voor veteranengezinnen

Gepubliceerd: 22-01-2018 Laatste bijgewerkt: 21-12-2024

1) Om te onderzoeken wat de effectiviteit van Multi-familie therapie (MFT) versus individueel gerichte 'treatment as usual' (TAU) is wat betreft gezinsfunctioneren, zoals gerapporteerd door de veteraan. TAU is individueel georiënteerd,...

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Ethische beoordeling</b> | Goedgekeurd WMO       |
| <b>Status</b>               | Beëindigd             |
| <b>Type aandoening</b>      | Overige aandoening    |
| <b>Onderzoekstype</b>       | Interventie onderzoek |

## Samenvatting

### ID

NL-OMON46428

### Bron

ToetsingOnline

### Verkorte titel

Multi-familie therapie (MFT) voor veteranengezinnen

### Aandoening

- Overige aandoening

### Synoniemen aandoening

Ernstig verstoord uitzendgereleerd familie functioneren bij veteranengezinnen

### Aandoening

Uitzendgerelateerd gezinsdisfunctioneren bij veteranengezinnen

### Betreft onderzoek met

Mensen

## Ondersteuning

**Primaire sponsor:** Universiteit Utrecht

**Overige ondersteuning:** Landelijk zorgsysteem Veteranen-PAO

## Onderzoeksproduct en/of interventie

**Trefwoord:** Familie functioneren, Multi-familie therapie (MFT), Post-traumatische stressstoornis (PTSS), Veteranengezinnen

## Uitkomstmaten

### Primaire uitkomstmaten

Familie functioneren zoals gerapporteerd door de veteraan middels de SCORE-15.

### Secundaire uitkomstmaten

Familie functioneren gerapporteerd door de veteraan diens partner en kinderen (12 jaar en ouder), kind functioneren gerapporteerd door beide ouders en de kinderen (12 jaar en ouder), relatie functioneren gerapporteerd door beide ouders. PTSS klachten, emotieregulatie, en mentaliseren gemeten bij de veteraan.

## Toelichting onderzoek

### Achtergrond van het onderzoek

De negatieve invloed van post-traumatische stressstoornis (PTSS) en meer specifiek uitzendgerelateerde PTSS op gezinsfunctioneren is goed gedocumenteerd. Echter blijft er een gebrek aan empirisch bewijs voor de effectiviteit van gezinsgerichte interventies wat betreft PTSS en gezinsfunctioneren binnen de veteranenpopulatie. In het bijzonder zijn interventies die ontwikkeld zijn voor de behoeften van veteranen en diens gezinnen relatief nieuw en nauwelijks onderzocht.

### Doel van het onderzoek

1) Om te onderzoeken wat de effectiviteit van Multi-familie therapie (MFT) versus individueel gerichte 'treatment as usual' (TAU) is wat betreft

gezinsfunctioneren, zoals gerapporteerd door de veteraan. TAU is individueel georiënteerd, gericht op de PTSS symptomen, terwijl MFT systeem/contextueel georiënteerd is, gericht op het verbeteren van gezinsfunctioneren door het mentaliserend vermogen alsook de emotieregulatie capaciteiten bij de ouders te versterken. 2) Om te onderzoeken wat de effectiviteit van MFT versus TAU is, gekeken naar andere familiematen (familie functioneren beoordeelt door de partner en kind (12 jaar en ouder), kind functioneren beoordeelt door ouders afzonderlijk en het kind zelf (12 jaar en ouder), en relatie functioneren beoordeelt door ouders afzonderlijk), maar ook door te kijken naar indicatoren op het niveau van de individuele veteraan (ptss klachten, mentaliserend vermogen, en emotieregulatie).

## **Onderzoeksopzet**

Het betreft een multisite onderzoek waarin gebruikt gemaakt wordt van een observationeel design met twee onderzoekarmen waarbij de interventiegroep/MFT+TAU vergeleken wordt met de controlegroep/TAU.

## **Onderzoeksproduct en/of interventie**

Multi-familie therapie (MFT), behorend tot de standaardzorg binnen de instellingen die participeren in dit onderzoek, is een programma voor gezinnen met kinderen (leeftijd beneden 18) en heeft als doel het ontlocken van gedragsveranderingen tussen familieleden door het herstructureren van interactie patronen in gezinnen. Binnen MFT wordt er gewerkt met diverse subsystemen. Zo vindt er interactie plaats op verschillende niveaus, wat verschillende perspectieven biedt en mogelijkheden biedt om te experimenteren met nieuw gedrag. Wanneer gezinnen elkaars problemen met elkaar delen, kan dat wederzijds begrip opleveren en tevens inzichtgevend werkend. MFT is reeds succesvol toegepast bij diverse problemen en stoornissen. Het toegepaste model, >Mentalization based familiy therapy> (Marlborough model) is gericht op het versterken van mentaliseren (capaciteit om eigen emoties alsook die van anderen te begrijpen) om zo gezinsfunctioneren te versterken. Vandaar dat het Marlborough model van MFT in mogelijk in het bijzonder geschikt is voor de behandeling van de negatieve gevolgen van trauma binnen families.

## **Inschatting van belasting en risico**

MFT wordt reeds aangeboden door verschillende GGZ instellingen in Nederland, zo ook de instellingen die participeren in deze studie. Het effect van MFT is aangetoond bij diverse patiëntenpopulatie. Derhalve wordt niet verwacht dat MFT contraproductief zal zijn. Naast een computertaak, bestaan taken uit het invullen van een aantal vragenlijsten, waarbij sommige onderdeel zijn van de standaardmetingen. De metingen zijn niet stresserend. Risico's en last worden daarom als minimaal ingeschat. Na afloop van deelname aan dit onderzoek wordt er gekeken of nazorg nodig is. Op de lange termijn biedt deze studie inzicht in de werkzaamheid van gezinsgerichte therapie bij veteranengezinnen.

## Contactpersonen

### Publiek

Universiteit Utrecht

Padualaan 14 Padualaan 14  
Utrecht 3584CH  
NL

### Wetenschappelijk

Universiteit Utrecht

Padualaan 14 Padualaan 14  
Utrecht 3584CH  
NL

## Locaties

### Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

## Deelname eisen

### Leeftijd

Adolescenten (12-15 jaar)  
Adolescenten (16-17 jaar)  
Volwassenen (18-64 jaar)  
65 jaar en ouder

### Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

1. Leeftijd ouders is >18
2. Eén ouder is uitgezonden geweest (is derhalve een veteraan)
3. Familie disfunctioneren: de totaalscore op de SCORE-15 (een maat voor familie functioneren), ingevuld door de veteraan, is 37.5 of hoger
4. Ouders hebben tenminste één kind die bij hen woont (leeftijd <18)

5. De veteraan schrijft het familie disfunctioneren toe aan de uitzending

## **Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)**

1. Acute suïcidaliteit conform DSM-5
2. Actuele psychotische stoornis
3. Actueel misbruik van partner of kind(eren)
4. Neurologische, fysieke, cognitieve, of intellectuele beperkingen bij een gezinslid die interfereert met MFT groepsdeelname
5. Families die reeds een vorm van koppel-, familie-, of ouderschapsgerelateerde therapie volgen.
6. Beide ouders zijn uitgezonden geweest (zijn veteraan).

## **Onderzoeksopzet**

### **Opzet**

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Type:            | Interventie onderzoek   |
| Onderzoeksmodel: | Anders                  |
| Toewijzing:      | Niet-gerandomiseerd     |
| Blinding:        | Open / niet geblindeerd |
| Controle:        | Actieve controle groep  |
| Doel:            | Behandeling / therapie  |

### **Deelname**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Nederland               |                       |
| Status:                 | Beëindigd             |
| (Verwachte) startdatum: | 29-11-2018            |
| Aantal proefpersonen:   | 120                   |
| Type:                   | Werkelijke startdatum |

## **Ethische beoordeling**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Goedgekeurd WMO |            |
| Datum:          | 22-01-2018 |

Soort: Eerste indiening  
Toetsingscommissie: METC NedMec

## Registraties

### Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

### Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

### In overige registers

| Register | ID             |
|----------|----------------|
| CCMO     | NL64137.041.17 |